

Livelli massimi raccomandati per le aflatossine nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali (Sec. 683.100 Action Levels for Aflatoxins in Animal Feeds - FDA)

Prodotto	Aflatossine (µg/kg)
Prodotti a base di mais e arachidi per bovini in finissaggio	300
Farine di semi di cotone intese per manzi, suini o pollame (senza distinzione di età o stato dell'allevamento)	300
Prodotti a base di mais e arachidi per suini in finissaggio di 100 pounds o più grandi	100
Prodotti a base di mais e arachidi, e altri alimenti e ingredienti zootecnici, escluse le farine di seme di cotone, intese per animali non maturi	20
Prodotti a base di mais e arachidi, farine di seme di cotone, e altri alimenti e ingredienti zootecnici, intese per animali da latte, per le specie animali o gli usi non specificati prima, o quando l'uso non è noto	20

Livelli massimi raccomandati per le fumonisine nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali (Guidance for Industry – Fumonisin Levels in Human Foods and Animal Feeds, Novembre 9, 2001 - FDA)

Mais e sottoprodotti del mais per:	Fumonisine totali (FB₁+FB₂+FB₃) (mg/kg)
Equini e conigli	5 (non oltre il 20% della dieta)*
Suini e pesce gatto	20 (non oltre il 50% della dieta)*
Ruminanti, pollame e visoni (compresi animali in lattazione e galline ovaiole)	30 (non oltre il 50% della dieta)*
Ruminanti = 3 mesi allevati per la macellazione e visoni allevati per la produzione di pelle	60 (non oltre il 50% della dieta)*
Pollame allevato per la macellazione	100 (non oltre il 50% della dieta)*
Tutte le altre specie o classi di bestiame e animali domestici	10 (non oltre il 50% della dieta)*

*Su base peso secco

Livelli massimi raccomandati per il deossinivalenolo (DON) destinati all'alimentazione degli animali (September 16, 1993 - FDA)

Prodotto	DON (mg/kg)
<i>Feed</i>	
Cereali e sottoprodotti dei cereali destinati a manzi e bestiame > di 4 mesi e per pollame con la raccomandazione che questi ingredienti non superino il 50% della dieta	10
Cereali e sottoprodotti dei cereali destinati a suini con la raccomandazione che questi ingredienti non superino il 20% della dieta	5
Cereali e sottoprodotti dei cereali destinati a tutti gli altri animali con la raccomandazione che questi ingredienti non superino il 40% della dieta	5